Cet Jllustre corps académique à qui J'ay L'honneur de la présenter.
Il y reconnoitra non de Simples Chancres que des frictions bien administrées guérissent presque toujours, mais un Cancer des plus Conformés Et de ceux qu'en opérant l'on Se croiroit heureux de guérir. plein de ces idées, il me Semble entendre Convenir que faute d'attention à La Cause il en perit beaucoup par L'operation, que d'ailleurs une Cure de pareille Conséquence n'a pas été Longue, Et qu'elle S'est terminée très heureusement.

par M. Banchot me en chir. à Vannes.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

n° 46.

~~Deuxième observation.~~

~~Communiquée par le même~~, Sur une fracture complete Et compliquée des deux os de La Jambe.

Le 12e 8bre 1743. Je fus appellé pour le nommé Mahaut fermier des pourpris de Houalland, près d'hennebond, Convalescent d'une pleuresie qui S'etoit terminée par une enflure oedemateuse aux Jambes. Il y avoit dix Jours qu'étant yvre il entra de nuit, Et Sans lumiere dans une Ecurie ou il reçut plusieurs coups de pieds d'une Jument fougueuse qui y etoit. il en fut renversé, Le tibia de la Jambe gauche fut fracturé un peu obliquement à Sa partie moyenne Superieure, Le peroné Le fut aussi en cet endroit, Et plus bas près de Son articulation avec L'astragal; les extremités des os à L'endroit de la premiere fracture s'entrevoyoient par une playe très considérable.
Le Lendemain de cet accident Le malade fut Charroyé à vingt lieües Chez un païsan fameux remetteur du païs; La longueur du Chemin, les Secousses de la Charette, Et Le défaut de pansement avoient augmenté la playe, et aggravé le mal; mais la mauvaise méthode du prétendu remetteur, dont tout le mérite n'est gueres qu'une frivole réputation héritée de Ses peres, pensa mettre la malheureuse Victime de Sa Crédulité hors d'Espoir de guérison. enfin abandonné de ce Célebre artiste, le blessé revint avec peine chez Luy, ou Je fus appellé comme Je L'ay dit Le 10e Jour de L'accident.

ARC 31 d 1 n° 46

Je trouvay le malade avec fievre, frissons irreguliers, Et foiblesses frequentes.
J'examinay La jambe pliée latéralement du dehors au dedans, Et
J'apperçeus par La playe L'extrémité Supérieure du tibia, J'entends
sa portion fracturée; celle du péroné étoit engagée dans le principe
du muscle Solaire, L'extrémité inferieure de la Continuité du même os
très éloignée de Sa position naturelle, Se trouvoit engagée dans un des
Jumeaux: L'on Sent bien qu'il y avoit Lezion aux fibres du Long du
Cour peronier Et du profond &c. mais il n'y eut point d'artere interessée.
La fracture près L'articulation étoit aussi Complette; mais Le Corps
du péroné quoique Vacillant paroissoit avoir encore un peu d'adhérence
au perioste, Et au Ligament inter-osseux, ce qui me le fit conserver, Sans
néant-moins oser me flatter qu'il ne Se détacheroit pas de luy même.
Il Se présentoit à cette fracture Sur La malléolle externe une Ecchimose
de la grosseur d'un oeuf que J'ouvris tout de Suite pour donner Jour
à un demi Verre de Sang corrompu.
En Comprimant un peu La Jambe, il Sortit aussi par La playe de
la fracture Supérieure environ deux Verres de Sérosité brune d'odeur
foetide. le fond de ladite playe de Couleur blafarde, plusieurs flictaines
à L'extérieur de la Jambe et du pied, le tout parsemé de points Livides
d'une fracture à L'autre, m'annoncerent plus qu'un commencement de
mortification.
Cependant Le Sujet étant peu en état de Soutenir les Suites d'une
amputation, et d'ailleurs prest de Succomber, je luy fis prendre une potion
Cordiale alexitere pour ranimer les liqueurs: J'ouvris les flictaines Et
scarifiay La peau presque Jusqu'au tissu cellulaire, Et J'y passay dessus
Le stirax dissous dans de L'esprit de Vin Camphré, aiguisé de Sel
amoniac Et couvris aussi Le tout d'un Cataplasme résolutif, animé
des plantes Vulnéraires. le poulx S'éleva dans la nuit, Le matin Je
me déterminay à faire une petite Saignée du bras: je Renouvellay
Le Cataplasme, Et L'après midy m'appercevant d'un peu de mieux
Je fis les incisions convenables, pour dégager les extrémités des os, afin
de les rapprocher de leur centre; mais les muscles en contraction par

ACADÉMIE NATIONALE DE [...] BIBLIOTHÈ[...]

L'engorgement de toute la Jambe ne me permirent que Le Lendemain Les extensions assez suffisantes pour La réduction, à laquelle y étant parvenüe Le matin douzième, après avoir injecté du baume du commandeur aux entrées des canaux des os et sur la moëlle déja corrompuë, je mis sur les endroits desdits os découverts des plumaceaux empreints du même baume: je pensay les playes avec d'autres couverts d'un dijestif animé, J'appliquay une compresse fenduë et extremement Longue, Le surplus de ce qui embrassoit simplement la Jambe, après un renversé, passoit dans un des angles du bandage à vingt-quatre chefs augmenté contre L'ordinaire pour La méthode cy après; puis Le reste de L'appareil convenable; Le tout arrosé d'esprit de Vulneraire.

Le 13e J'ouvris L'appareil sans tirer la Jambe de la goutière que J'avois fabriquée, et après avoir fait glisser vers moy 8 à 10 pouces de la compresse ditte fenduë, je coupay cette portion ainsi que 6 chefs du bandage, parcequils étoient abrevés de pus d'une odeur Cadavereuse, en Conséquence la Jambe s'étoit un peu dégorgée; du 14 au 18 J'entends toujours de L'accident, les pansemens furent suivis comme il est marqué: La suppuration devint abondante, chargée ces derniers jours de filamens membraneux, charnus qui se détachoient des muscles, du fond des playes, et des endroits scarifiés.

TIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Le 19 et 20 Je découvris et sonday plusieurs clapiers dont un conduisoit vers L'insertion du tendon D'Achilles: Je les ouvris dans toutes Leurs étenduës, à L'exception de ce dernier, qui étant d'une Longueur considérable du côté opposé, ou J'avois fait L'ouverture de L'ecchimose, et pénétrant entre des muscles quil m'eut fallu presque détruire, j'y passay un séton mince en m'écartant un peu de la direction inférieure, et en tenant Le pied plus Elevé que de Coutume nous en avons été quittes pour un petit abcès fistuleux qui paroissoit fournir du Ligament capsulaire à la partie posterieur du Calcaneum, et qui s'est cependant terminé avec Légere exfoliation du même os par Les dilatations convenables, à L'entière guérison.

Le Cal ne Commença à se faire comme je L'avois prévû, qu'après l'exfoliation des os depuis si long tems découverts et dénués en partie de Leur périoste Le 35e il sortit une esquille assez considérable de L'extremité supérieure

Du tibia longue de 5 à 6 Lignes, Et presque de toute Sa Circonférence Cilindrique; la Chûte a peu près Semblable de L'infarieurne Se fit que le 41. Le péroné nén a fourni quune apparente de Sa fracture Supérieure. le Calus près L'articulation parût Se former en moins de tems, parceque L'os navoît point eté découvert, avant L'ouverture de L'Ecchimose: il Se fit quelques dépots à La Circonférence de Lad. articulation inférieure, qui neurent aucune Suite facheuse.

quinze Jours de plus Se passerent fort avantageusement; Le Cal même Sembloit S'avancer par tout, Lorsquil nous arriva un facheux contretems occasionné par L'imprudente Curiosité du malade. Se Voyant un jour Seul avec Sa femme, il luy fit dépoüiller Sa Jambe de tout Son appareil, et osa même Se Lever. cette démarche hardie pensa luy couter Cher: La Jambe Se recourba, Les playes Se rouvrirent, les os dela fracture Supérieure reparurent un peu à découvert; cependant la femme avoît remis L'appareil, mais on juge bien de quelle maniere: Les douleurs revinrent avec fievre violente et insomnie. Le malade eut la constance de Souffrir deux jours Sans Se Vanter du fait: L'ayant enfin avoüé on me fit rappeller. je trouvay la Jambe extremement gonflée; la Circonférence de la playe enflammée, La Suppuration Supprimée, (car elle suintoit encore par des playes moins considérables avant ce dernier accident) Et le dérangement des os comme jay dit. je Le Saignay deux fois, jappliquay Le même cataplasme, et Le Soir vû Le dégorgement par Le retour du pus, je réduisis de nouveau Ladite fracture.

Les accidens ont cessé peu à peu, par Le régime et les remedes convenables. il Sortit encore quelques Lames écailleuses de la Crete du tibia: enfin cette cure a eté terminée en 90 Jours comprenant Les 10 D'ambulance. on l'estime d'autant plus parfaite que La Jambe en question est aussi droite que L'autre Et ne paroît presque pas avoir diminué de Sa Longueur naturelle, malgré les exfoliations.

La nature Surmonte bien Souvent les accidents. Ses ressources Sont admirables dans La réunion des deux tiers de ce péroné fracturé en deux endroits et pour ainsi dire détaché, Sans autre adhérence qu'à de très petites portions des muscles, du périoste et du Ligament inter-